

Tabela

Kukurydza na kisonkę. Doświadczenia porejestrowe 2006. Plon ogólny suchej masy, dt /ha

odmiany/stacje	Kobierzyce	Kość-Wieś	Krzyżewo	Radoszów	Rychliki	Słupia Jędrz.	Smolice	Wrótkowo	średnia	% wzorca	Nie włączone do syntezy						
											Chrzastowo	Rarwino	Sulejów	Cicibór	Swadzim	Tomaszów w Bol.	
Grupa 1 - wczesne																	
wzorzec:	176,4	138,3	182,8	165,1	146,0	157,2	185,1	228,5	172,4			115,7	119,0	94,2	123,0	100,1	65,3
1 Anjou 238	171,2	133,0	165,2	161,2	131,6	159,0	183,0	213,9	164,7	95,6	118,7	126,7	93,5	122,9	109,4	64,9	
2 Boomerang	169,2	121,0	185,4	166,6	158,7	147,4	178,2	231,0	169,7	98,4	120,4	113,3	99,8	143,0	107,5	71,7	
3 Coxximo	182,9	147,1	189,1	173,7	141,1	161,6	183,4	219,1	174,7	101,3	108,2	103,5	92,1	132,4	87,5	64,6	
4 Coxcto	175,3	139,4	191,3	168,5	172,3	155,4	180,1	223,7	175,7	101,9	119,1	126,2	102,4	118,2	114,3	75,0	
5 Orient	171,2	133,1	164,1	151,9	128,6	152,2	174,3	229,6	163,1	94,6	89,6	111,4	82,0	96,8	73,9	51,1	
6 Silvestre	188,7	156,2	201,5	169,0	143,3	167,3	211,8	253,7	186,4	108,1	138,0	133,1	95,6	124,4	108,2	64,5	
CV	4,4	8,9	8,2	4,6	11,4	4,5	7,3	6,1	5,0								
NRI, dt/ha	9,99	8,36	5,93	3,08	7,86	5,50	7,43	7,31	9,50		4,91	18,90	6,96	18,20	15,13	2,91	
NRI, %	5,7	6,0	3,2	1,9	5,4	3,5	4,0	3,2	5,5		4,2	15,9	7,4	14,8	15,3	4,5	
Grupa 2 - średniowczesne																	
wzorzec:	193,4	134,6	210,7	182,9	153,4	164,3	191,5	235,5	183,3			126,7	122,8	86,9	129,7	98,1	70,4
7 Delitop	194,8	129,0	198,4	162,0	140,0	152,0	197,1	201,4	171,8	93,8	110,4	120,6	94,2	111,8	86,5	71,7	
8 Graneros	198,1	140,5	247,8	196,0	181,7	173,9	200,6	273,2	201,5	109,9	140,3	135,6	81,5	140,4	103,9	70,3	
9 KOSM0230	204,1	125,9	170,4	168,5	125,1	172,4	184,5	221,7	171,6	93,6	124,0	117,0	75,4	134,8	97,7	53,5	
10 LG 3225	181,7	129,8	203,3	191,1	173,5	149,5	187,8	218,2	179,4	97,9	124,1	111,2	92,0	133,6	84,2	68,8	
11 Menuet	207,2	144,4	216,7	193,6	165,5	167,7	198,3	263,1	194,6	106,2	149,4	119,4	111,0	134,4	112,9	82,8	
12 Monumental	190,4	139,9	210,0	194,2	140,0	164,4	192,2	220,8	181,5	99,0	118,0	111,5	81,3	145,8	97,6	73,8	
13 Opoka	194,9	145,8	232,8	180,9	159,8	193,0	184,9	250,1	192,8	105,2	147,5	138,7	89,6	122,7	104,2	81,7	
14 PR39T45	204,2	127,5	230,7	198,5	173,5	153,3	199,0	269,3	194,5	106,1	124,0	130,8	94,3	130,4	102,1	74,0	
15 Romario	188,8	133,3	207,7	183,1	134,9	163,2	194,4	245,9	181,4	99,0	141,7	125,9	72,0	123,9	95,6	56,9	
16 Sastra	186,7	125,7	203,7	179,6	145,9	156,9	181,8	225,9	175,8	95,9	94,7	119,7	85,7	136,1	101,9	78,6	
17 System	176,1	138,7	195,9	164,5	147,3	161,2	185,9	201,1	171,3	93,5	119,5	120,5	78,7	113,3	92,7	63,0	
CV	5,1	5,6	10,0	7,2	12,0	7,6	3,5	11,1	5,9								
NRI, dt/ha	15,11	9,09	10,01	6,54	6,53	8,45	9,29	7,73	12,23		5,50	21,04	12,99	10,37	16,77	3,55	
NRI, %	7,8	6,8	4,8	3,6	4,3	5,1	4,9	3,3	6,7		4,3	17,1	14,9	8,0	16,9	5,0	
Grupa 3 - średniopóźne																	
wzorzec:	172,1	119,1	208,3	185,8	148,7	174,3	182,5	235,5	178,3			142,2	126,7	103,0	113,9	175,8	85,3
18 Anjou 248	175,1	132,6	207,2	181,3	146,3	170,1	180,2	220,7	176,7	99,1	143,5	113,3	110,1	103,1	169,5	93,6	
19 Anjou 290	174,6	112,6	214,3	208,5	158,4	170,1	190,9	256,8	185,8	104,2	142,6	145,8	103,1	115,2	214,9	86,2	
20 Gavott	169,8	104,4	207,4	190,8	143,5	163,9	185,0	233,2	174,8	98,0	138,5	131,2	93,4	115,9	190,7	68,3	
21 KB2704	181,5	128,9	213,4	198,9	173,0	174,7	188,6	235,2	186,8	104,8	141,8	136,6	100,9	127,3	165,7	87,1	
22 Markiza	157,4	107,4	204,1	151,1	116,6	175,1	170,5	224,1	163,3	91,6	139,6	114,2	99,8	111,8	154,1	85,8	
23 PR39F58	174,1	129,0	203,1	184,2	154,5	191,6	179,7	243,2	182,4	102,3	147,4	119,2	111,0	109,8	159,9	90,7	
CV	4,7	10,4	2,2	10,6	12,7	5,4	4,0	5,6	4,9								
NRI, dt/ha	11,26	10,67	6,16	6,67	9,48	12,32	11,38	7,88	10,04		6,58	17,88	8,75	15,50	22,91	2,09	
NRI, %	6,5	9,0	3,0	3,6	6,4	7,1	6,2	3,3	5,6		4,6	14,1	8,5	13,6	13,0	2,5	
średnia ogólna	183,4	131,5	202,8	179,0	150,2	165,0	187,5	233,7	179,1		127,9	122,8	93,0	123,8	118,9	73,0	

Wzorce poszczególnych grup tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach

Tabela

Kukurydza na kisonkę. Doświadczenia porejestrowe 2006. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym, %

odmiany/stacje	Kobierzyce	Kość-Wieś	Krzyżewo	Radostowo	Rychliki	Słupia Jędrz.	Smolice	Wrótkowo	średnia	% wzorca	Nie włączone do syntezy						
											Chrzastowo	Rarwino	Sulejów	Cicibór	Swadzim	Tomaszów Bol.	
Grupa 1 - wczesne																	
wzorzec:	31,8	28,2	32,7	29,4	30,8	33,1	35,7	30,5	31,5			25,9	38,6	29,4	34,6	24,6	27,4
1 Anjou 238	31,7	27,2	29,7	28,6	27,6	33,2	35,3	30,0	30,4	96,5		25,3	36,6	30,0	33,1	24,7	24,6
2 Boomerang	31,9	27,2	32,4	29,5	34,3	31,8	35,1	30,7	31,6	100,4		25,7	35,6	30,2	39,5	24,0	25,3
3 Coxximo	31,7	29,3	33,7	31,4	27,7	34,0	35,9	29,9	31,7	100,6		28,4	40,2	28,9	38,5	26,1	28,4
4 Coxcto	31,4	29,3	34,7	30,7	35,2	33,5	35,5	31,3	32,7	103,8		26,4	36,7	30,3	34,7	26,8	30,4
5 Orient	34,0	27,6	32,3	28,2	31,8	34,1	38,0	30,8	32,1	101,9		21,8	41,0	28,5	28,3	21,3	29,2
6 Silvestre	30,1	28,4	33,3	28,3	27,9	31,6	34,2	30,4	30,5	96,9		28,1	41,4	28,6	33,6	24,7	26,6
CV	4,0	3,4	5,3	4,5	11,3	3,3	3,6	1,7	2,8								
NRI	0,58	0,48	0,76	0,24	0,83	0,99	0,39	0,40	1,54			0,53	1,90	0,40			
Grupa 2 - średniowczesne																	
wzorzec:	32,0	26,5	32,8	33,7	31,5	31,3	34,6	30,7	31,6			29,0	40,9	30,8	38,4	23,1	27,0
7 Delitop	32,2	27,2	36,4	35,3	32,5	32,7	36,2	30,8	32,9	104,0		33,1	43,6	32,1	38,0	24,2	28,4
8 Graneros	30,8	25,6	34,6	33,8	33,6	29,0	32,1	31,1	31,3	99,0		26,3	39,2	29,7	39,0	22,0	24,2
9 KOSM0230	34,2	26,4	30,1	32,2	26,8	33,9	36,0	29,1	31,1	98,3		30,2	41,8	32,1	37,8	25,7	32,1
10 LG 3225	33,6	25,8	33,5	34,5	35,8	31,8	37,1	31,6	32,9	104,2		33,6	38,5	34,0	38,7	24,2	28,2
11 Menuet	31,5	27,1	33,8	33,7	32,9	32,4	33,8	31,6	32,1	101,5		30,1	41,7	31,0	39,1	23,4	25,1
12 Monumental	30,8	26,7	31,3	33,2	28,3	29,8	33,5	29,8	30,4	96,2		27,8	39,4	31,1	39,3	24,6	28,1
13 Opoka	30,0	26,3	31,4	32,7	30,3	31,8	32,8	30,2	30,7	97,0		30,5	38,7	31,1	37,2	21,1	24,9
14 PR39T45	30,9	25,3	32,5	32,7	34,5	27,6	33,3	30,1	30,9	97,6		27,1	41,6	29,2	38,9	22,2	24,5
15 Romario	30,7	27,4	31,4	33,9	27,4	30,8	35,1	30,6	30,9	97,8		30,8	40,9	29,2	36,3	22,4	28,7
16 Sastra	34,0	26,4	34,2	35,4	31,6	31,0	35,9	32,1	32,6	103,0		21,7	43,8	29,2	39,6	24,2	25,7
17 System	33,6	27,0	32,0	33,0	32,8	33,0	35,0	30,2	32,1	101,4		28,2	40,5	30,2	39,0	20,6	26,8
CV	4,8	2,6	5,6	3,1	9,4	6,0	4,7	2,9	2,9								
NRI	0,63	0,43	0,61	0,34	0,57	0,54	0,41	0,38	1,51			0,57	1,43	0,43			
Grupa 3 - średniopóźne																	
wzorzec:	30,1	25,4	31,2	31,4	28,7	30,5	32,3	30,4	30,0			29,5	37,0	29,8	37,5	35,5	26,2
18 Anjou 248	31,2	27,4	32,2	31,4	28,2	31,6	34,5	30,6	30,9	103,0		30,8	38,1	31,7	36,5	37,6	27,1
19 Anjou 290	28,0	24,5	28,2	31,4	27,1	28,4	31,3	29,4	28,5	95,1		27,7	35,1	29,4	38,5	36,0	24,2
20 Gavott	30,2	24,5	32,7	32,9	30,9	30,6	33,0	31,3	30,7	102,5		29,7	40,1	29,0	36,9	36,9	27,8
21 KB2704	32,2	25,5	32,9	31,0	32,3	31,0	33,3	30,4	31,1	103,5		30,6	37,1	30,1	38,4	35,4	26,5
22 Markiza	27,8	25,3	29,1	28,1	22,6	29,0	29,0	29,5	27,5	91,8		26,3	33,2	28,0	36,1	31,7	26,1
23 PR39F58	31,3	25,1	32,0	33,5	31,3	32,2	32,9	31,3	31,2	104,0		31,8	38,5	30,8	38,4	35,2	25,2
CV	6,0	4,2	6,5	6,0	12,4	4,9	6,0	2,8	5,2								
NRI	0,69	0,59	0,43	0,31	0,43	0,79	0,76	0,38	1,34			0,47	1,51	0,49	0,08		
średnia ogół.	31,5	26,6	32,4	32,0	30,6	31,5	34,3	30,6	31,2			28,3	39,3	30,2	32,7	26,7	26,9

Wzorce poszczególnych grup tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach

